s 波 Fractional Vortex における電子状態 - トポロジカルな性質による新奇束縛状態 -

東大理^A、理研^A、東大総合文化^B永井佑紀^A、加藤雄介^BQuasiparticle Bound States around Fractional Vortices in *s*-wave SuperconductorUniv. of Tokyo^{A,B}, RIKEN^A,Y. Nagai^A, Y. Kato^B

渦度が 1 である通常の vortex では、超伝導秩序変数の位相は vortex まわりで 2π 変化する。渦度が $1/n$ である Fractional vortex (分数量子渦) ではそのまわりで位相は $2\pi/n$ 変化する。この Fractional vortex は d 波超伝導体に囲まれた s 波超伝導体の隅や一部の高温超伝導体によって観測できる可能性があると言われてきた。また、近年、実験的に Fractional vortex を確認したというグループも現れてきている [1]。

そこで、我々は渦度が $1/n$ の Fractional Vortex が n 本存在する二次元 s 波超伝導体を考え、その系での電子状態を準古典近似の範囲内でルンゲクッタ法による数値計算と我々が開発した解析的手法 [2] の両方で調べた。通常の vortex の近傍では Andreev 束縛状態が形成されるが、Fractional Vortex 近傍ではそのほかに新しい束縛状態が生じることがわかった。この新しい束縛状態は低エネルギー領域と高エネルギー領域にそれぞれ現れ、秩序変数の位相の空間的な不連続性に由来するものである。Half vortex が x 軸上に二つある系での x 軸方向に走る準粒子の分散関係と局所状態密度のエネルギー依存性を図. 1 に示す。また、渦度が $1/2$ 、 $1/3$ 、 $1/4$ の場合は束縛状態の数はそれぞれ 2,3,4 個あることもわかった。これらの結果は STM/STS によって分数量子渦の情報を引き出せる可能性を示唆している。

図 1: Half vortex が二つ x 軸上にあるときの、 x 軸方向に走る準粒子の (a) 分散関係の y 依存性と (b) 局所状態密度のエネルギー依存性。 Δ はバルクでのギャップの大きさ。低エネルギー領域にギャップが開いており、高エネルギー領域には新奇な束縛状態が生じているのがわかる。

[1] M. Machida *et al.* Physica C, **412-414**,367(2004).; M. Yamamoto *et al.* JPS 春季大会 21pWF-2 (2007); Y. Tanaka *et al.*, Jpn. J. Appl. Phys. **46**, 134 (2007).

[2] Y. Nagai *et al.*, J. Phys. Soc. Jpn. **75** (2006) 104701.